

نشرة العبوة: معلومات لمستخدم الدواء

فروساك 20 ملجم حديد/ مل

محلول للحقن أو محلول مركز للحقن عن طريق التسريب

اقرأ كل ما بهذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ بتناول هذا الدواء

- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أى أسئلة إضافية، اسأل طبيبك المعالج أو الصيدلى الذى تتعامل معه.
- هذا الدواء تم وصفه لك. لا تعطيه للآخرين. فقد يضرهم حتى لو كانت أعراضهم هى نفس أعراضك.
- إذا لاحظت أن أىاً من الآثار الجانبية لهذا الدواء أصبحت جسيمة، أو لاحظت ظهور أعراض جانبية لم ترد فى هذه النشرة، فضلاً أخبر طبيبك المعالج أو الصيدلى الذى تتعامل معه.

هذه النشرة تحتوى على ما يلى:

1. ما هى أمبولات فروساك وفيم تستخدم.
2. ما يجب مراعاته قبل تناول أمبولات فروساك.
3. كيفية تناول أمبولات فروساك.
4. الأعراض الجانبية المحتملة.
5. كيفية حفظ أمبولات فروساك.
6. معلومات إضافية.

1. ما هى أمبولات فروساك وفيم تستخدم

فروساك هو مستحضر دوائى يحتوى على الحديد.

تستخدم المستحضرات الدوائية المحتوية على الحديد عندما يكون مستوى الحديد بالجسم غير كاف. وذلك يسمى ب"نقص الحديد".

يعطى فروساك فى الحالات الآتية:

إذا كنت لا تستطيع تناول الحديد عن طريق الفم – مثلاً فى حالة شعورك بالمرض عند تناول أقراص الحديد.

إذا كان تناول الحديد عن طريق الفم لا يعطى التأثير المطلوب.

2. ما يجب مراعاته قبل استخدام أمبولات فروساك

يجب عدم إعطائك فروساك فى الحالات الآتية:

- إذا كنت تعاني من فرط التحسس لأى من مكونات فروساك (والمذكورة فى فقرة 6).
- إذا كنت تعاني من الأنيميا التي لا تحدث بسبب نقص الحديد.
- إذا كانت لديك كميات كبيرة من الحديد فى جسمك أو أنك تعاني من مشكلة فى طريقة استخدام جسمك للحديد.

• إذا تعرضت للإصابة في أى وقت بالرئو، إكزيما أو تفاعلات تحسسية أخرى. ذلك بسبب أنك أكثر عرضة للإصابة بالحساسية.

• إذا كنت في فترة الثلاثة أشهر الأولى من الحمل.

يجب عدم إعطائك فروساك إذا كانت تنطبق عليك أى من الحالات المذكورة أعلاه. إذا كنت غير واثق، تواصل مع طبيبك قبل التعرض للعلاج بفروساك.

ينبغي توخي الحذر مع العلاج بفروساك

تحقق من خلال طبيبك قبل التعرض للعلاج بفروساك في الحالات الآتية:

• إذا كنت مصابا بأى عدوى.

• إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.

في حالة عدم تأكده من انطباق أي من الحالات المذكورة أعلاه عليك، تواصل مع طبيبك المعالج أو الصيدلي قبل التعرض للعلاج بفروساك.

تناول أدوية أخرى

فضلا أخبر طبيبك المعالج أو الصيدلي في حالة تناولك مسبقا أو حاليا أى أدوية أخرى. بما في ذلك الأدوية التي حصلت عليها بدون وصفة طبية، وتشمل الأدوية العشبية.

ذلك بسبب أن فروساك قد يؤثر على طريقة عمل بعض الأدوية الأخرى. أيضا من الممكن أن تؤثر بعض الأدوية الأخرى على عمل فروساك.

بشكل خاص أخبر طبيبك المعالج أو الصيدلي في حالة تناولك للأدوية الآتية:

الأدوية المحتوية على الحديد والتي يتم تناولها عن طريق الفم. حيث أن هذه الأدوية قد لا تكون فعالة إذا تم تناولها في نفس وقت إعطائك فروساك. عند الانتهاء من التعرض للعلاج بفروساك، يجب عليك الانتظار لمدة 5 أيام قبل تناول الأدوية المحتوية على الحديد عن طريق الفم.

الحمل والرضاعة

يجب عدم إعطاء فروساك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. سوف يقرر طبيبك المعالج إذا كان من الممكن أن يتم إعطائك فروساك خلال الفترة من الشهر الرابع حتى الشهر التاسع من الحمل.

من المستبعد أن ينتقل فروساك إلى لبن الأم. لذلك ينبغي عدم وقوع الضرر لطفلك في حالة إرضاعك لطفلك رضاعة طبيعية أثناء خضوعك للعلاج بهذا الدواء.

إسأل طبيبك المعالج أو الصيدلي للنصيحة قبل تناول أى أدوية، في حالة الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

تصنيف هذا الدواء طبقا لاستخدامه في الحمل: الفئة B

القيادة واستخدام الآلات

ربما تشعر بالدوخة أو عدم التركيز بعد إعطائك فروساك. فى حالة حدوث ذلك لا تقم بقيادة السيارة أو استخدام أية أدوات أو آلات. إذا كنت غير متأكد إسأل الطبيب.

3. كيفية إعطاء فروساك

سوف يتم إعطاؤك فروساك عن طريق الطبيب.

سوف يتخذ طبيبك القرار بشأن كمية فروساك التى سيعطيها لك. وسوف يتخذ طبيبك القرار أيضا بشأن عدد المرات والمدة الزمنية التى تحتاجها لخضوعك للعلاج بفروساك. وسوف يقوم الطبيب بإجراء اختبار للدم ليتحقق من الجرعة المناسبة لك. فى حالة عدم تعرضك للعلاج بفروساك من قبل, سيتم إعطاؤك أولا كمية قليلة من فروساك (وهى جرعة اختبار). وذلك للتأكد من عدم وجود حساسية عندك لهذا الدواء.

كيفية إعطاء فروساك

يمكن إعطاء فروساك ب3 طرق مختلفة:

- عن طريق الحقن البطئى فى الوريد - من 1 إلى 3 مرات فى الأسبوع.
 - عن طريق الحقن بالتسريب (التقطير) فى الوريد - من 1 إلى 3 مرات فى الأسبوع.
 - أثناء الغسيل الكلوى - حيث يتم وضع الدواء فى الطرف الوريدى لجهاز الغسيل.
- فروساك هو سائل بنى اللون لذلك سيبدو الحقن أو الحقن عن طريق التقطير باللون البنى.

الأطفال

لا يوصى باستخدام فروساك للأطفال.

4. الأعراض الجانبية محتملة الحدوث

مثل جميع الأدوية, فروساك قد يسبب آثار جانبية, وإن لم تكن تحدث لكل من يتناول هذا الدواء.

تفاعلات الحساسية (تصيب أقل من 1 لكل 1000 شخص)

فى حالة تعرضك لتفاعلات الحساسية, أخبر طبيبك المعالج أو الممرضة فورا. والتى قد تشمل علاماتها:

- انخفاض ضغط الدم (وأعراضه الشعور بالدوخة أو الإغماء).
- تورم الوجه.
- صعوبة فى التنفس.

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من الحساسية, أخبر طبيبك المعالج أو الممرضة فورا.

أعراض جانبية أخرى وتشمل:

أعراض جانبية شائعة الحدوث (تصيب أقل من 1 لكل 10 أشخاص)

- تغيرات فى حاسة الذوق لديك مثل الشعور بالطعم المعدنى. والذى لا يستمر عادة لفترة طويلة من الوقت.

أعراض جانبية غير شائعة الحدوث (تصيب أقل من 1 لكل 100 شخص)

- سرعة ضربات القلب.
- صداع أو الشعور بالدوخة.
- انخفاض ضغط الدم والهبوط.
- قصف ضربات القلب (الخفقان).
- ألم بالمعدة أو إسهال.
- غثيان أو تقيؤ.
- أزيز أو صعوبة فى التنفس.
- حكة أو طفح جلدي أو احمرار الجلد.
- تقلصات أو ألم بالعضلات.
- احمرار الوجه.
- حمى أو ارتعاش.
- ضيق وألم بالصدر.
- تفاعلات حول منطقة الحقن مثل الالتهاب والشعور بالحرق والتورم.

أعراض جانبية نادرة الحدوث (تصيب أقل من 1 لكل 1000 شخص)

- الإغماء.
- فقد الوعي.
- التتميل أو الشعور بوخز الإبر.
- الشعور بالحرق.
- ارتفاع ضغط الدم.
- الشعور بالحرارة.
- التورم (داء الاستسقاء).
- ألم فى المفاصل.

• تورم اليدين والقدمين.

• الإرهاق أو التعب أو الشعور العام بالمرض.

أعراض جانبية أخرى وتشمل: الشعور بقلّة الانتباه أو الدوخة أو عدم التركيز, تورم المفاصل والوجه واللسان, زيادة التعرق, ألم الظهر, انخفاض معدل ضربات القلب, تغييرات في لون البول.

إذا لاحظت أن أيًا من هذه الآثار الجانبية أصبح جسيماً، أو إذا لاحظت ظهور أي أعراض جانبية لم ترد في هذه النشرة فإنه يرجى أن تخبر طبيبك المعالج بشأنها.

5. كيفية تخزين فروساك

يحفظ بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

لا تستعمل فروساك بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة.

لا تقم بتخزين فروساك في درجة أعلى من 25°C درجة مئوية. لا تقم بتجميد فروساك. تحفظ الأمبولات في العبوة الأصلية.

يجب استخدام أمبولات فروساك فور فتحها مباشرة.

بعد تخفيف أمبولات فروساك بمحلول الملح يجب استخدام المحلول المخفف على الفور.

سوف يتم تخزين أمبولات فروساك بشكل طبيعي من قبل الطبيب أو المستشفى.

6. معلومات إضافية

محتويات أمبول فروساك

المادة الفعالة هي الحديد (على هيئة مركب حديد(ثلاثي التكافؤ)- هيدروكسيد السكروز). يحتوى كل مل على 20 ملجم حديد.

المواد الأخرى هي: ماء للحقن وهيدروكسيد صوديوم.

شكل أمبولات فروساك ومحتويات العبوة

فروساك هو محلول مائي غير شفاف لونه بني قاتم.

محتويات عبوة فروساك:

5 أمبولات زجاجية تحتوى كل منها على 5 مل. كل أمبول 5 مل يكافئ 100 ملجم من الحديد.

إنتاج الدوائية

مصنع الأدوية بالقصيم

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

المملكة العربية السعودية

تم الموافقة على هذه النشرة بتاريخ يونيو 2012.

النسخة: 1.